

Behandling med filler (t.ex. Restylane)

Patientinformation

Du har beslutat Dig för att genomgå en behandling med filler, som är en steril gelé av stabiliserad, icke-animalisk hyaluronsyra som injiceras i ansiktsvävnaden för korrigeringar i ansiktet. Din behandlare har givit Dig följande information:

- ◇ Filler injiceras i ansiktsvävnaden för att jämna ut fåror och rynkor samt för att omforma läppar och utforma ansiktskonturer. Det används också för att återställa elasticiteten i hya samt minska ojämnheter.
- ◇ Varaktigheten är ca 3-12 månader (läppar ca 3-6 månader), beroende på behandlingsområde, hudtyp och injektionsteknik. Behandlingens varaktighet kan ibland vara kortare eller längre.
- ◇ Önskad grad av korrigering kan upprätthållas med hjälp av fyllnings- och uppföljningsbehandlingar.
- ◇ Beroende på området som ska behandlas kan bedövning ske med bedövningssalva.
- ◇ Allt smink avlägsnas och området desinficeras med klorhexidin innan behandlingen.
- ◇ För att göra behandlingsupplevelsen mer behaglig innehåller Restylane lokalbedövningsmedlet Lidokain. Allergiska reaktioner är sällsynta men om du tidigare har reagerat bör du meddela din behandlare detta.
- ◇ Efter injektionen kan vissa vanliga injektionsrelaterade reaktioner uppstå, exempelvis svullnad, rodnad, smärta, klåda, missfärgning, blåmärken och ömhet vid injektionsstället. De här reaktionerna går vanligtvis över av sig själva under loppet av 1-2 dagar efter injektion i ansiktsvävnaden och inom 1 vecka efter injektion i läpparna.
- ◇ När rynkor behandlas i områden med underliggande känslig anatomi kan nerver, kärl och ögon påverkas.
- ◇ I sällsynta fall har inflammatoriska reaktioner rapporterats, de har bestått av rodnad, svullnad och skleros vid injektionsstället. Reaktionerna har uppstått några dagar till veckor efter behandlingen och genomsnittligen bestått i 2 veckor. I sällsynta fall har reaktionerna varit återkommande och kvarstått i flera månader.
- ◇ I mycket sällsynta fall har det uppstått en förlängd sklerosbildning, varbildning samt en gråaktig missfärgning vid injektionsstället. Detta kan utvecklas efter veckor eller månader och kan kvarstå i flera månader. I sällsynta fall har längre varaktighet rapporterats, men de här reaktionerna avtar ofta med tiden.

- ◇ I extremt sällsynta fall har ytliga ärr bildats som följd av en sårskorpa och ömsande av skinn vid behandlingsstället. Behandlingen kan leda till ocklusion av blodkärl, med potentiellt sår- och ärrbildning till följd och i extremt sällsynta fall bestående synpåverkan.
- ◇ Skulle det uppstå en komplikation kan du alltid nå din behandlare genom att ringa till kliniken, du hittar nummer på www.ak.se/kontakta-oss/ eller ring kundtjänst på 08-614 54 00
- ◇ Är du gravid eller ammar ska du inte behandlas med filler.

Jag försäkrar att uppgifterna som jag har lämnat är sanna och korrekta och att jag har läst och förstått det här dokumentet.

Jag är nöjd med den information jag har. Ansvarig behandlare har gett mig en klar och tydlig genomgång och jag har fått svar på mina frågor. Jag har också blivit informerad om, förstått och accepterat omfattningen av de risker och eventuella biverkningar som behandlingen kan medföra.

Härmed ger jag mitt godkännande att genomgå en injektionsbehandling med filler.

Namn.....

Personnr.....

Ort.....Datum.....

Underskrift.....

AKADEMIKLINIKENS ANSVAR

- Akademikliniken har sin patientförsäkring hos Folksam dit patienten hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Akademikliniken.
- Akademiklinikens kliniker är registrerade hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet.