



PolyPhil injektionsbehandling Patientinformation

Du har beslutat dig för att genomföra en injektionsbehandling med PolyPhil. Din behandlare har givit dig följande information:

PolyPhil, PolyPhil Eye, PolyPhil Hair innehåller alla polynukleotider med High Purification Technology (HPT) för att hjälpa till och främja hudföryngring. PolyPhil Next innehåller polynukleotider, icke-tvärbunden hyaluronsyra och mannitol för att främja kollagensyntesen och minska nedbrytningen av hyaluronsyra. PolyPhil har både återfuktande och viskoelastiska egenskaper. PolyPhil främjar och stimulerar kroppens fibroblaster vilket utlöser kroppens naturliga kollagenproduktion och hjälper till att förbättra hudens spänst och elasticitet. Polynukleotider förbättrar också hudens naturliga förmåga att behålla fukt, vilket resulterar i en mer återfuktat och ungdomligt utseende.

PolyPhil injiceras ytligt i huden med en tunn nål och innebär en liten risk för allvarliga biverkningar. Behandlingen är progressiv och utförs som en kur vilket innebär att resultatet kommer succesivt och slutgiltigt resultat kan utläsas tidigast 4 veckor efter avslutad kur. Resultatets varaktighet är ca 5–6 månader, men kan variera beroende på hud typ, vilket område som behandlas samt vilken mängd som injiceras. Önskad grad av korrigerande kan upprätthållas med underhållsbehandlingar. Din behandlare kommer att ge dig råd om din personliga, individualiserade behandlingsplan som är anpassad efter dina förutsättningar.

De flesta patienter är nöjda med resultatet efter en kur med PolyPhil men som vid alla estetiska förfaranden finns det ingen garanti för att du kommer att vara helt nöjd. Det finns heller ingen garanti för att rynkor och veck helt kommer att försvinna, eller att du inte kommer att behöva ytterligare behandling för att uppnå önskat resultat. Resultatet av behandlingen är tillfälligt och det kommer att krävas underhållsbehandlingar för att bibehålla effekten. Jag är medveten om att varaktigheten av behandlingen är beroende av många faktorer, inklusive men inte begränsat till: ålder, kön, vävnadsförhållanden, min allmänna hälsa och livsstilsförhållanden samt solexponering.

Biverkningar och komplikationer inkluderar, men är inte begränsade till:

- Smärta eller sveda under injektionen.
- Injektioner runt läppområdet kan utlösa ett återfall av munsår i ansiktet (herpes simplex-infektioner) för patienter med en historia av tidigare munsår.
- Lokal svullnad, rodnad och/eller ömhet.
- Blödning vid injektionsställena.
- Blåmärken
- Svullnad i injektionsområdet försvinner i allmänhet inom kort, men kan fortfarande vara synligt efter några dagar.

Sällsynta biverkningar:

- Ihållande stickningar, smärta, svullnad eller inflammation.
- Infektion (kan uppstå inom några dagar eller så länge som månader).
- Allergisk reaktion eller fördröjd känslighetsreaktion - rekommenderas inte för personer med fiskallergi.
- Kompression /Ocklusion- blodtillförseln till huden kan avbrytas av svullnad eller oavsiktlig injektion i ett kärl, vilket orsakar smärta och/eller missfärgning. Detta kan leda till nekros i hud om den inte behandlas, hudskador och möjlig ärrbildning. (Mycket sällsynta).
- Andra biverkningar som inte har nämnts kan förekomma.

Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer:

- PolyPhil ska inte användas till patienter under 18 år.
- PolyPhil får inte ges till patienter med följande:
- Pågående herpesinfektion
- Infektion
- Tidigare eller pågående autoimmuna sjukdomar som påverkar immunsystemet, eller patienter som för närvarande
- Genomgår immunterapi
- Allvarliga allergier
- Allergier mot någon av produktkomponenterna
- Risken för blåmärken eller blödning kan öka av läkemedel med antikoagulerande effekt, t.ex. acetylsalicylsyra och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. Ibuprofen, Voltaren, Naproxen), höga doser av E-vitamin och vissa örter (ginkgo biloba, johannesört).
- PolyPhil får inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
- Minimera exponeringen av det behandlade området för solljus eller extrem värme/kyla, åtminstone tills alla/eventuella svullnader har avtagit.
- Undvik alkohol och intensiv träning 24 timmar före och efter behandling.
- Använd inte smink på det behandlade området under 12 timmar.

Jag förstår att den faktiska graden av förbättring inte kan förutsägas eller garanteras. Dessutom har jag förstått att effekten gradvis kommer att avta och att ytterligare behandlingar kan vara nödvändiga för att upprätthålla önskad effekt. Så vitt jag vet är jag inte gravid och jag ammar inte. Jag har blivit informerad om de möjliga biverkningar och komplikationer som är förknippade med detta ingrepp. Det är möjligt att biverkningar som inte beskrivs kan förekomma, och om detta skulle hända måste jag informera min behandlare omedelbart.

Jag bekräftar att jag har fått muntlig och skriftlig information om denna behandling, vilket inkluderar eftervård och uppföljande råd, samt att beslutet att bli behandlad är mitt eget och helt frivilligt. Jag samtycker till att följa råden om eftervård och förstår att detta minskar risken för biverkningar och hjälper till att säkerställa optimalt resultat. Jag har blivit informerad och förstått att det finns risk för biverkningar och komplikationer vid alla invasiva behandlingar och fått möjlighet att ställa frågor och erhållit tillfredsställande svar på dessa. Jag har givits information om andra likvärdiga behandlingsalternativ. Jag förstår att jag har rätt att avbryta behandlingen när som helst och har givits lagstadgad betänketid på 48 timmar inför behandlingen. 48 timmars betänketid gäller samtliga invasiva ingrepp såvida du inte har utfört samma behandling inom de senaste 6 månaderna. Jag samtycker härmed till behandling med PolyPhil och förfarandet har förklarats fullständigt för mig. Jag förstår att behandlingen som utförs är mellan mig och min behandlare och jag kommer att rikta eventuella frågor eller bekymmer relaterat till behandlingen till den behandlande kliniken. Jag godtar riskerna med behandlingen och jag intygar att om det sker förändringar i min medicinska historia kommer jag att meddela min behandlare detta.

Jag försäkrar att uppgifterna som jag har lämnat är sanna och korrekta och att jag har läst och förstått det här dokumentet.

Jag är nöjd med den information jag har. Ansvarig behandlare har gett mig en klar och tydlig genomgång och jag har fått svar på mina frågor. Jag har också blivit informerad om, förstått och accepterat omfattningen av de risker och eventuella biverkningar som behandlingen kan medföra.

Härmed ger jag mitt godkännande att genomgå en injektionsbehandling med Polyphil.

AKADEMIKLINIKENS ANSVAR

- *Akademikliniken har sin patientförsäkring hos Folksam dit patienten hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Akademikliniken.*
- *Akademiklinikens kliniker är registrerade hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet.*